Médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC

Dans quel cas le médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC est-il prescrit ?

Ce médicament contient des antiacides d'action locale. Ils agissent en neutralisant les acides sécrétés par l'estomac.
Il est utilisé dans le traitement des brûlures d'estomac et des remontées acides.

Présentations du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC

MAALOX MAUX D'ESTOMAC : suspension buvable (arôme citron) ; boîte de 20 sachets

	p sachet
Aluminium hydroxyde	460 mg
Magnésium hydroxyde	400 mg
Saccharose	3,15 g
Sorbitol	+

Substances actives : Aluminium hydroxyde, Magnésium hydroxyde, Oxyde d'aluminium hydraté
Aucun excipient commun.

Contre-indications du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'insuffisance rénale grave.
Attention Il est préférable de consulter un médecin dans les situations suivantes :

- troubles de la digestion apparaissant pour la première fois, ou si les troubles ont changé récemment ;
- troubles associés à une perte de poids ;
- difficulté à avaler ou gêne abdominale persistante.

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les symptômes persistent.
Compte tenu de la teneur en aluminium de ce médicament, des précautions sont nécessaires chez les insuffisants rénaux traités par dialyse.
Les personnes souffrant de douleurs d'estomac doivent éviter d'utiliser des médicaments contenant de l'aspirine ou des AINS qui fragilisent la muqueuse de l'estomac. Le paracétamol est en revanche sans danger pour traiter les douleurs ou la fièvre.
Les sachets de suspension buvable contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable.
Interactions du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC avec d'autres substances
Ce médicament peut diminuer l'absorption de nombreux médicaments. Un délai d'au moins 2 heures (voire 4 heures avec les antibiotiques de la famille des quinolones) doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Fertilité, grossesse et allaitement

Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mode d'emploi et posologie du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC

Ce médicament doit être pris environ 1 heure et demie après les repas ou au moment des douleurs.
La suspension buvable en sachet et en flacon doit être avalée telle quelle, sans être diluée. Le sachet doit être malaxé avant ouverture et le flacon doit être agité vigoureusement avant l'emploi.
Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 15 ans : 1 à 2 comprimés à croquer ou 1 à 2 sachets ou 1 cuillère à soupe de suspension buvable, 1 à 6 fois par jour

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.
Conseils
Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les symptômes dus aux remontées acides ou à une inflammation de l'estomac.
Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac.

Effets indésirables possibles du médicament MAALOX MAUX D'ESTOMAC
Constipation ou diarrhée : les sels d'aluminium favorisent la constipation alors que le magnésium peut avoir un effet laxatif. Suivant les personnes, l'un ou l'autre de ces effets peut prédominer.
Laboratoire Sanofi-Aventis France

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr
Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.